

MANTÉNGASE INFORMADO/A

¿Cuáles son los síntomas de la mpox (viruela de mono)?

La mpox pueda causar fiebre e hinchazón de los ganglios linfáticos. También pueden presentarse dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, escalofríos y agotamiento. Se desarrolla un sarpullido doloroso y pasa por varias etapas, incluidas ampollas llenas de líquido y pus que eventualmente se vuelven duras, se forman costras y se caen.

¿La mpox puede propagarse a través del sexo?

La mpox puede propagarse a través de cualquier tipo de contacto de piel a piel con una persona infectada, incluido, entre otros, el contacto sexual. En este momento, no se sabe si el virus de la mpox se propagará a través del semen o los fluidos vaginales. Sin embargo, el sarpullido puede parecerse a los síntomas de las ITS, como el herpes y la sífilis. El contacto boca con piel puede propagar la viruela del simio cuando ampollas están presentes. Es posible que los condones no eviten la propagación de la mpox.

¿Qué debería hacer si creo que tengo mpox?

Si cree que tiene mpox, comuníquese con El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH, por sus siglas en inglés), Epi-on-Call al **405-426-8710** para una consulta confidencial gratuita, o con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento, pruebas y atención médica. Aíslese de los demás para protegerlos de infecciones. Cubra todas las ampollas posibles (por ejemplo, usar ropa encima del sarpullido).

¿Qué debo hacer si soy contacto de un caso confirmado de mpox?

Los contactos cercanos de alguien que tiene la mpox puedan ser elegibles para la vacunación posterior a la exposición para prevenir la enfermedad. Para una consulta de contacto cercano, llame a OSDH Epi-on-Call al **405-426-8710**. Observe sus síntomas durante 21 días desde la exposición. Si se desarrollan síntomas, aíslese de los demás y comuníquese con OSDH Epi-on-Call o con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento y pruebas.



**DATOS BREVES
SOBRE LA MPOX**