



¡Mantenerse saludable!

# Requisitos de inmunización para Oklahoma Año escolar 2026-2027

Todos los niños de dos meses de edad y mayores deben presentar un registro de vacunación o solicitar una exención antes de que se les permita asistir a la guardería o a la escuela en Oklahoma. Por favor, lea la página posterior para obtener información esencial.

Vacunas requeridas  
con dosis acumuladas

## Cuidado infantil (desde el nacimiento hasta los tres años)

- 4 x DTaP
- 1-4 x PCV
- 1-4 x Hib
- 1 x SRP
- 1 x Varicela
- 3 x IPV
- 2 x Hep A
- 3 x Hep B

## Preescolar (cuatro años)

- 4 x DTaP
- 1 x SRP
- 1 x Varicela
- 3 x IPV
- 2 x Hep A
- 3 x Hep B

## Kinder a 6° grado

- 5 x DTaP
- 2 x SRP
- 1 x Varicela
- 4 x IPV
- 2 x Hep A
- 3 x Hep B

## 7° a 12° Grado

- 1 x Tdap
- 5 x DTaP
- 2 x SRP
- 1 x Varicela
- 4 x IPV
- 2 x Hep A
- 3 x Hep B

Vacunas  
recomendadas

- Influenza estacional

- Influenza estacional
- Segunda dosis de varicela a los cuatro años de edad
- IPV en o después del cuarto cumpleaños

- Influenza estacional
- Segunda dosis de varicela a los cuatro años de edad
- IPV en o después del cuarto cumpleaños

- Influenza estacional
- 2-3 x VPH
- 1-2 x MCV4
- 2-3 x Men B



### CLAVE

**DTaP** - difteria, tétanos, tos ferina  
**PCV** - neumocócico  
**Hib** - haemophilus influenza tipo B  
**SRP** - sarampión, paperas, rubeola

**Tdap** - tétanos, difteria, tos ferina  
**VPH** - Virus del papiloma humano  
**MCV4** - antimeningococia MenACWY  
**Varicela**

**IPV** - polio  
**Hep A** - hepatitis A  
**Hep B** - hepatitis B  
**Influenza estacional** - gripe

## Notas de vacunación

- Las dosis administradas cuatro días o menos antes de los intervalos mínimos o edades se cuentan como dosis válidas. Esto no se aplica al intervalo mínimo de 28 días entre dosis de vacunas vivas no administradas el mismo día.
- No es necesario reiniciar la serie de ninguna vacuna si una dosis se administró tarde o si una dosis está vencida. Las dosis adicionales de una serie de vacunas que se administran después de la fecha de vencimiento no afectan la inmunidad final.
- A los niños se les puede permitir asistir a la guardería y la escuela si han recibido al menos una dosis de todas las vacunas requeridas que vencen para su edad o grado, y las próximas dosis aún no vencen. Deben completar las dosis restantes de la vacuna a tiempo. Estos niños están en proceso de recibir inmunizaciones.

### Varicela

Si un padre informa que su hijo tenía enfermedad de varicela, el niño no está obligado a recibir la vacuna contra la varicela. Registrar los antecedentes de varicela del niño.

La primera dosis de varicela debe administrarse en o después del primer cumpleaños del niño (o dentro de los cuatro días anteriores al cumpleaños) o no contarán para el requisito de inmunización y deben repetirse.

### SRP & Hep A

Las primeras dosis de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SRP) y la hepatitis A deben administrarse en o después del primer cumpleaños del niño (o dentro de los cuatro días anteriores al cumpleaños) o no contarán para el requisito de inmunización y deben repetirse.

### Hib & PCV

Las vacunas Hib y PCV no son necesarias para los estudiantes en programas preescolares, pre-kinder o kinder operados por las escuelas a menos que la instalación sea una instalación de cuidado infantil con licencia. Las vacunas Hib y PCV son obligatorias para los niños que asisten a centros de cuidado infantil autorizados.

El número de dosis de PCV y/o Hib puede variar de una a cuatro dependiendo de la edad del niño, cuándo se administró la primera dosis y tipo de vacuna utilizada.

### DTaP

Si la cuarta dosis de DTaP se administra en o después del cuarto cumpleaños del niño, entonces no se requiere la quinta dosis de DTaP.

### IPV

Si la tercera dosis de IPV se administra en o después del cuarto cumpleaños del niño, y al menos seis meses desde la dosis anterior, entonces no se requiere la cuarta dosis de IPV.

### Hep B

Los estudiantes de 11 a 15 años que no hayan recibido la vacuna contra la hepatitis B pueden recibir una serie de dos dosis de la vacuna Merck® contra la hepatitis B en adultos para cumplir con este requisito. Todos los demás niños (menores o mayores) deben recibir tres dosis de la vacuna pediátrica contra la hepatitis B.

### Tdap

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan una dosis de Tdap en o después del cumpleaños número 10, incluso si se recibió anteriormente. Una dosis inadvertida de DTaP en o después del cumpleaños número 10 puede ser aceptada para el requisito de Tdap de séptimo grado.

Para obtener más información, llame al Servicio de Inmunización al (405) 426-8580 o visite [oklahoma.gov/health/services/personal-health/immunizations](http://oklahoma.gov/health/services/personal-health/immunizations).

El horario actual de vacunación infantil se puede encontrar en [cdc.gov/vaccines/schedules/index.html](http://cdc.gov/vaccines/schedules/index.html).